

113 ポラツズマブ＋BR療法（リツキシマブ＋ベンダムスチン＋ポラツズマブ）

■適応：再発又は難治性のDiffuse Large B-Cell Lymphoma

投与量

リツキシマブ 375mg/m² day1
 ベンダムスチン 90mg/m² day1,2
 ポラツズマブ 1.8mg/kg day1

21日サイクル、6コース点滴施行する

薬品名	投与時間	day1	day2	...	... day21
・生理食塩液 50mL	ルートキープ	↓	↓		
・生理食塩液 50mL＋デキサート(4mg)2A＋グラニセترون1A	30分	↓	↓		
・リツキシマブ375mg/m ² ＋生理食塩液(10倍で希釈)	規定速度で	↓			
・生理食塩液50mL（リツキシマブ投与後30分経過観察）	30分	↓			
・ポライビー1.8mg/kg＋生理食塩液100mL	90分	↓			
・生理食塩液50mL（ポライビー投与後30分経過観察）	30分	↓			
・ベンダムスチン90mg/m ² ＋生理食塩液250mL	60分	↓	↓		
コメント 基本的にはメーカー資料のポライビー適性使用ガイドに準じて行う。 初回投与時は、リツキシマブとポライビーは同日投与はせず、リツキシマブを1日目、ポライビーを2日目に投与する。 ポライビー、リツキシマブのinfusion reactionを軽減させるため、投与30分から1時間前に抗ヒスタミン剤、アセトアミノフェンを服用する。 ポライビー投与時はフィルターを使用する 主な副作用：infusion reaction、骨髄抑制、感染症、消化器症状、末梢性ニューロパチー、腫瘍崩壊症候群、肝障害など					

参考文献

- ①中外製薬 ポライビー適性使用ガイド
- ②NCCN Guideline Version4.2021,Diffuse Large B-Cell Lymphoma
- ③ポライビー添付文書