120 Nivolumab＋CapeOX療法

■適応：進行再発胃がん　1次治療

投与量

オプジーボ	360mg/body　day1	
オキサリプラチン	130mg day1 2hr div	３週毎を1コースとして繰り返す。
カペシタビン(経口薬)	day1夕～day15朝、分２	

薬品名	投与時間	day1	day8	day15	・・・	day22
①生理食塩液　100mL（ルートキープ）	5分	↓				↓
②オプジーボ240mg＋生理食塩液50mL	30分	↓				↓
③ 生理食塩液100mL＋アロカリス1V＋パロノセトロン1A＋デキサート1.65mg3A	30分	↓				↓
④オキサリプラチン130mg/㎡＋５%ブドウ糖液250mL	120分	↓				↓
カペシタビンは下記用量を分２で内服（day1夕～day15朝）	１日２回朝夕	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●				●

体表面積	Cape用量
＜1.36㎡	2400mg/day
1.36㎡～1.66㎡	3000mg/day
1.66㎡～1.96㎡	3600mg/day
1.96㎡≦	4200mg/day

主な副作用：骨髄抑制、消化器症状、末梢神経障害、下痢、脱毛、倦怠感、過敏反応、infusion reaction、免疫関連有害事象（irAE）