

122 FOLFOX+Pmab(Panitumumab)療法

■適応:RAS遺伝子野生型の治癒切除不能な進行再発大腸がん

投与量

パニツムマブ

6mg/kg day1

オキサリプラチン

85mg day1 2hr div

5FU

400 day1 2hr div

5FU

2400mg/m² day 1 46hr civ

2週毎を1コースとして繰り返す。(PDまで)

薬品名	投与時間	day1	day8	day15	day22
①生理食塩液 100mL (ルートキープ)	5分	↓		↓	
②ベクティビックス6mg/kg+生理食塩液100mL	90分	↓		↓	
③生理食塩液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1A+デキサート1.65mg3	30分	↓		↓	
④オキサリプラチン85mg/m ² +5%ブドウ糖液250mL	120分	↓		↓	
④5%ブドウ糖液250mL+レボホリナート200mg/m ²	120分	↓		↓	
⑤5FU400mg/m ² +生理食塩液50mL	15分	↓		↓	
⑥5FU2400mg/m ² +生食適量(全量100mL、インフューザーで)	46時間	↓		↓	
主な副作用: infusion reaction, 皮膚障害(ざ瘡様皮疹)、低マグネシウム血症、骨髄抑制、消化器症状、末梢神経障害、下痢、脱毛、倦怠感、など					