

125 SP療法(3週毎)

■適応：進行再発胃癌

シスプラチン 60mg/m² day1 2hr div
S-1(経口薬) day1タ～day15朝、分2

3週毎を1コースとして繰り返す。

薬品名	投与時間	day1	day8	day15	...	day22
①生理食塩液 100mL (ルートキープ)	5分	↓				↓
②ハルトマンG3号500mL+硫酸マグネシウム補正液0.5A	2時間	↓				↓
③ 生理食塩液500mL	2時間	↓				↓
④生食100ML+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキサート9.9mg	30分	↓				↓
⑤マンニトール 300mL	30分	↓				↓
⑥シスプラチン60mg/m ² +生理食塩液250mL	2時間	↓				↓
⑦ハルトマンG3号500mL	2時間	↓				↓
⑧ハルトマンG3号500mL	2時間	↓				↓
エスワンは下記用量を分2朝夕で内服(day1夕～day15朝)		●	●	●	●	●

体表面積	S-1用量
$<1.25\text{m}^2$	80mg/day
$1.25\text{m}^2 \sim 1.5\text{m}^2$	100mg/day
$1.5\text{m}^2 \leq$	120mg/day

主な副作用：骨髄抑制、消化器症状、腎機能障害、末梢神経障害、下痢、脱毛、倦怠感など
シスプラチンによる腎毒性予防のため尿量確保が必要で大量補液を行うため基本入院での治療となる。