

142 Zolbetuxima(ビロイ)+FOLFOX療法

■適応:CLDN18.2陽性かつHER2陰性 胃がん 1次治療

投与量

ビロイ 初回は800mg/m²、2回目以降は400mg/m² day1
 オキサリプラチン 130mg day1 2hr div 2週毎を1コースとして繰り返す。
 5FU 400 day1 2hr div
 5FU 2400mg/m² day 1 46hr civ

薬品名	投与時間	day1	...	day8	...	day15	...	day22
①生理食塩液 100mL (ルートキープ)	5分	↓				↓		
②生理食塩液100mLアロリス1V+ハロ/セロン1A+デキサート3.3mg3A+ホラミン1A	30分	↓				↓		
③生理食塩液50mL(全開でフラッシュ)	全開で	↓				↓		
④ビロイ点滴静注 初回は800mg+生理食塩液 適量+調製用注射用水	★	↓						
④ビロイ点滴静注 2回目以降は400mg/m ² +生理食塩液 適量+調製用注射用水						↓		
⑤オキサリプラチン130mg/m ² +5%ブドウ糖液250mL	120分	↓				↓		
④5%ブドウ糖液250mL+レボホリナート200mg/m ²	120分	↓				↓		
⑤5FU400mg/m ² +生理食塩液50mL	15分	↓				↓		
⑥5FU2400mg/m ² +生食適量(全量100mL、インフューザーで)	46時間	↓				↓		

ビロイの点滴速度についての指示(初回導入)

●体表面積1.6m²未満の患者

投与開始～30分は60mL/時、30～60分は120mL/時、60分以降は180mL/時で点滴

●体表面積1.6m²以上の患者

投与開始～30分は80mL/時、30～60分は160mL/時、60分以降は240mL/時で点滴

★悪心嘔吐の様子で別紙のフローチャートに従って中断、減速、制吐薬追加指示あり(例外患者は別途指示)

主な副作用: 骨髄抑制、消化器症状、末梢神経障害、下痢、脱毛、倦怠感、過敏反応、infusion reaction、