

036 CAPIRI/IRIS+Bmab 療法

申請日 平成28年2月23日
委員会承認日 平成28年4月15日

病名:大腸がん
1コース:3週間ごと

			投与スケジュール																				
投与方法・投与量			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
末梢メイン																							
①	生理食塩液	100mL	↓																				
②	生理食塩液	100mL	↓																				
	ベバシズマブ	7.5mg/kg	↓																				
③	生理食塩液	100mL	↓																				
	ホスネツピタント 235mg	1v	↓																				
	パロノセトロン 0.75mg	1v	↓																				
	デキサート 3.3mg【4mg】	3A	↓																				
	投与時間:30分																						
④	5%ブドウ糖	250mL	↓																				
	イリノテカン	【120mg/m ² 】	↓																				
	投与時間:2時間																						
		*レボホリナートと並行して投与																					
④	生理食塩液	50mL	↓																				

・ベバシズマブは、初回投与90分、2回目60分、3回目以降30分かけて投与

・CAPIRIの場合、カペシタビン併用
 1.31m²未満 1800mg 1日2回(day1夕～開始 day15朝まで)2投1休で併用
 1.31m²未満1.64m²未満 2400mg 1日2回(day1夕～開始 day15朝まで)2投1休で併用
 1.64m²未満 3000mg 1日2回(day1夕～開始 day15朝まで)2投1休で併用

・IRISの場合、TS-1併用
 1.25m²未満 80mg 1日2回(day1夕～開始 day15朝まで)2投1休で併用
 1.25m²未満1.5m²未満 100mg 1日2回(day1夕～開始 day15朝まで)2投1休で併用
 1.5m²未満 120mg 1日2回(day1夕～開始 day15朝まで)2投1休で併用